МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФАРМАЦИЯ. ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»

30 ноября 2021 года состоялась онлайн-конференция молодых учёных «Фармация. Вызовы времени», организованная Первым Московским государственным медицинским университетом им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) и Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом. Ряд материалов конференции публикуются в данном номере журнала.

УДК 582.475.2:547.97

DOI: <https://doi.org/10.52540/2074-9457.2021.4.5>**К. С. Воронин¹, А. А. Фенин², И. А. Селиванова¹**

ФЛАВОНОИДЫ СУЧКОВОЙ ЗОНЫ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ

¹ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России, г. Москва, Россия

²ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева», г. Москва, Россия

*Исследован компонентный состав флавоноидной фракции сучковой зоны древесины лиственницы даурской *Larix dahurica* Turcz. методом хромато-масс-спектрометрии. В качестве ее компонентов выявлены дигидрокверцетин, арамадендрин, дигидроизорамнетин, эриодиктиол и кверцетин.*

Ключевые слова: дигидрокверцетин, сучковая зона древесины лиственницы, *Larix dahurica*, хромато-масс-спектрометрия.

ВВЕДЕНИЕ

Древесина лиственницы даурской *Larix dahurica* Turcz. является богатым источником биологически активных полифенольных соединений, в том числе флавоноидов. Ранее был изучен компонентный состав экстрактивных веществ комлевой зоны древесины лиственницы, на базе которых разработан фитопрепарат Диквертин. Его основным компонентом является флавоноид (2*R*,3*R*)-дигидрокверцетин (ДКВ), который обладает широким спектром фармакологического действия, основанном на его выраженной антиоксидантной активности [1]. Необходимость рационального использования древесины лиственницы предопределяет актуальность комплексного изучения других ее частей.

В настоящее время все большее приращение для исследования многокомпонентных растительных экстрактов находят инструментальные методы анализа, в том числе хромато-масс-спектрометрия, вве-

денная в Государственную фармакопею Российской Федерации XIV издания.

Цель исследования – установить компонентный состав флавоноидной фракции экстрактивных веществ сучковой зоны древесины лиственницы *Larix dahurica* Turcz. методом хромато-масс-спектрометрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служил полифенольный экстракт сучковой зоны древесины лиственницы («Аметис», г. Благовещенск). Компонентный состав экстракта определяли методом ВЭЖХ-МС/МС. В работе использовали хроматограф ACQUITY UPLC (Waters) с диодно-матричным детектором и tandemным квадрупольным масс-спектрометром Xevo TQD (Waters). Условия хроматографирования (условия): колонка ACQUITY UPLC BEH Phenyl 1,7 мкм (2,1 × 100 мм) (Waters); подвижные фазы: А – 0,5% водный раствор муравьиной кислоты, В – 0,5% рас-

твор муравьиной кислоты в ацетонитриле; градиентный режим элюирования: 0 мин – 100% А, 5 мин – 85% А, 7,5 мин – 75% А, 10 мин – 62,5% А, 15 мин – 100% В; скорость потока 0,2 мл/мин. Рабочие параметры масс-спектрометра: режим ионизации – положительный и отрицательный электроспрей; напряжение на капилляре – 3 кВ, напряжение на конусе – 30 В, напряжение в столкновительной ячейке – 20 В, температура газа-осушителя – 320 °С, скорость потока газа-осушителя – 700 л/ч, поток на конусе – 50 л/ч, температура источника – 150 °С. Идентификацию пиков на хроматограмме проводили путем сопоставления хроматографических и спектральных характеристик компонентов экстракта с аутентичными образцами и литературными данными.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для оптимизации условий хроматографического разделения компонентов исследуемого экстракта в качестве подвижной фазы использовали смеси воды с ацетонитрилом или метанолом с добавлением кислотных модификаторов: муравьиной и уксусной кислот. Испытаны изократический, градиентный и смешанный режимы элюирования. В качестве неподвижной фазы были опробованы фенильный и октадецилсилильный сорбенты. Исследованы режимы ионизации (положительный и отрицательный электроспрей), разные значения

параметров работы масс-спектрометра: напряжение на капилляре, напряжение на конусе, напряжение в столкновительной ячейке. Время удерживания (ВУ) и спектральные характеристики компонентов экстракта, полученные при оптимальных условиях (см. условия, «Материалы и методы»), представлены в таблице.

Таблица. – Данные хромато-масс-спектрометрии компонентов экстракта сучковой зоны древесины лиственницы

ВУ, мин	[M-H] ⁻	$\lambda_{\text{макс}}$, нм
6,80	303	289
7,08	303	289
7,80	287	287
8,05	317	287
9,04	287	286
9,20	301	230; 368

Пик с ВУ 6,80, при сравнении со стандартным образцом, был идентифицирован как (2*R*,3*R*)-ДКВ (рисунок 1), абсолютная конфигурация которого ранее определена методом рентгеноструктурного анализа [2]. Для (2*R*,3*R*)-ДКВ характерно диэкваториальное положение объемных заместителей: дигидроксифенильного кольца у атома С-2 и гидроксильной группы у атома С-3. По результатам молекулярного моделирования было установлено, что устойчивость стереоизомеров ДКВ уменьшается в ряду: (2*R*,3*R*)-ДКВ, (2*R*,3*S*)-ДКВ, (2*S*,3*R*)- и (2*S*,3*S*)-ДКВ [3, 4]. В случае (2*R*,3*S*)-изомера

а – (2*R*,3*R*)-ДКВ, б – (2*R*,3*S*)-ДКВ, в – (2*S*,3*R*)-ДКВ, г – (2*S*,3*S*)-ДКВ
Рисунок 1. – Стереизомеры ДКВ

гидроксильная группа у атома С-3 занимает аксиальное положение, что приводит к увеличению потенциальной энергии молекулы по сравнению с (2*R*,3*R*)-изомером. Таким образом, пик с ВУ 7,08 соответствует стереоизомеру ДКВ, которому может быть приписана (2*R*,3*S*)-конфигурация центров хиральности.

В УФ-спектре компонента, которому соответствует пик на хроматограмме с ВУ 9,20, наблюдается характерное для флавонолов поглощение в области 370 нм. Масс- и УФ-спектры, а также ВУ этого соединения

совпадают с таковыми аутентичного образца кверцетина (3,5,7-тригидрокси-2-(3,4-дигидроксифенил)-4*H*-1-бензопиранон-4; КВ). Компоненты с ВУ 7,80 и 9,04 имеют аналогичные спектральные характеристики и одинаковую молекулярную массу (288), отличающуюся от массы ДКВ на 16 единиц, что означает потерю одной гидроксильной группы. Таким образом, эти пики могут соответствовать биогенетически родственным ДКВ соединениям: флаванону – эриодиктиолу или флаванолу – дигидрокемпферолу (аромадендрину) (рисунок 2).

Рисунок 2. – Биогенетические родственники ДКВ

В спектре фрагментации пика молекулярного иона компонента с ВУ 7,80 наблюдаются пики: в режиме регистрации отрицательно заряженных ионов – m/z 269 [M-H-H₂O]⁻, m/z 259 [M-H-CO]⁻; в режиме регистрации положительно заряженных ионов – m/z 271 [M+H-H₂O]⁺, m/z 243 [M+H-H₂O-CO]⁺, что соответствует профилю фрагментации аромадендрина [5]. В свою очередь, в спектре компонента с ВУ 9,04 наблюдаются пики, характерные для фрагментации эриодиктиола в режиме регистрации отрицательно заряженных ионов: m/z 151 и m/z 135, которые соответствуют частицам, образующимся при разрыве связей гетероциклического кольца [6]. Хроматографические исследования на модельных смесях флавоноидов и растительных экстрактах показали, что флаванол аромадендрин в условиях обращенно-фазовой хроматографии элюируется после флаванола ДКВ (в связи с меньшей полярностью, из-за отсутствия одной гидроксильной группы по сравнению с ДКВ), но перед флавонолом КВ, в то время как флаванон эриодиктиол характеризуется большим ВУ, чем аромадендрин, но меньшим, чем КВ [7, 8]. Таким образом,

по сумме спектральных и хроматографических данных, компонент с ВУ 7,80 был идентифицирован как аромадендрин, а компонент с ВУ 9,04 – как эриодиктиол.

Компонент, которому соответствует пик на хроматограмме с ВУ 8,05, по масс- и УФ-спектрам может быть отнесен к одному из монометилловых эфиров ДКВ. Для уточнения положения метокси-группы был проведен сопоставительный анализ фрагментации пика молекулярного иона неизвестного компонента в режиме регистрации положительно заряженных ионов с профилем фрагментации ДКВ, для которого характерно образование двух интенсивных пиков: m/z 153 (относительная интенсивность 100%), обусловленного потерей кольца В в виде нейтральной частицы, и m/z 123 (относительная интенсивность 90,35%), принадлежащего 3,4-дигидроксибензильному катиону [9]. В спектре исследуемого соединения обнаруживаются пики m/z 153 (относительная интенсивность 100%), m/z 137 (относительная интенсивность 93,45%), но отсутствует пик m/z 123, что может быть связано с замещением одной из гидроксильных групп на метокси-группу в коль-

це В. Ранее сообщалось об обнаружении в различных частях лиственницы 3'-метилового эфира КВ – изорамнетина, следовательно, можно предположить, что компоненту с ВУ 8,05 соответствует его биоге-

нетический предшественник флаванол дигидроизорамнетин (2,3-дигидро-3,5,7-тригидрокси-2-(4-гидрокси-3-метокси)-4H-1-бензопиранон-4) [10], фрагментация которого изображена на рисунке 3.

Рисунок 3. – Основные пути фрагментации дигидроизорамнетина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам хромато-масс-спектрометрии в качестве компонентов флавоноидной фракции сучковой зоны древесины лиственницы даурской *Larix dahurica* Turcz. выявлены дигидрокверцетин, аромандрин, дигидроизорамнетин, эриодиктиол и кверцетин.

SUMMARY

K. S. Voronin, A. A. Fenin, I. A. Selivanova
FLAVONOIDS OF LARCH KNOTWOOD
Flavonoid fraction composition of *Larix dahurica* Turcz. knotwood was studied with HPLC-DAD/ESI-MS/MS. Dihydroquercetin, aromadendrin, dihydroisorhamnetin, eriodictyol and quercetin were revealed as its components.

Keywords: dihydroquercetin, larch knotwood, *Larix dahurica*, HPLC-DAD/ESI-MS/MS.

ЛИТЕРАТУРА

1. Плотников, М. Б. Лекарственные препараты на основе диквертина / М. Б. Плотников, Н. А. Тюкавкина, Т. М. Плотникова. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. – 228 с.
2. Исследование кристаллической структуры дигидрокверцетина / И. А. Селиванова [и др.] // Химико-фармацевт. журн. – 1999. – Т. 33, № 4. – С. 51–53.
3. Стереоизомерия дигидрокверцетина в формате молекулярного дизайна / И. А. Селиванова [и др.] // Сб. материалов IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Инновации в здоровье нации». – Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. химико-фармацевт.

акад, 2016. – С. 567–571.

4. Терехов, Р. П. Компьютерное моделирование как путь разработки фитопрепаратов на базе флавоноидов / Р. П. Терехов, И. А. Селиванова // Фармация. Спец. вып. – 2016. – С. 112–116.

5. Phenolic compounds from *Populus alba* L. and *Salix subserrata* Willd. (Salicaceae) counteract oxidative stress in *Caenorhabditis elegans* / N. Tawfeek [et al.] // Molecules. – 2019. – Vol. 24, N 10. – P. 1999.

6. Counter-current chromatography with off-line detection by ultra high performance liquid chromatography/high resolution mass spectrometry in the study of the phenolic profile of *Lippia origanoides* / S. G. Leitão [et al.] // J. of Chromatography. A. – 2017. – Vol. 1520. – P. 83–90.

7. Polyphenolic profile as a useful tool to identify the wood used in wine aging / M. Sanz [et al.] // Analytica Chimica Acta. – 2012. – Vol. 732. – P. 33–45.

8. Determination of flavonoids and phenolics and their distribution in almonds / P. E. Milbury [et al.] // J. of Agr. and Food Chemistry. – 2006. – Vol. 54, N 14. – P. 5027–5033.

9. A fragmentation study of dihydroquercetin using triple quadrupole mass spectrometry and its application for identification of dihydroflavonols in Citrus juices / B. Abad García [et al.] // Rapid Communications in Mass Spectrometry. – 2009. – Vol. 23, N 17. – P. 2785–2792.

10. Флавоноидные соединения коры лиственницы сибирской и лиственницы Гмелина / С. З. Иванова [и др.] // Химия растит. сырья. – 2002. – № 4. – С. 5–13.

REFERENCES

1. Plotnikov MB, Tiukavkina NA, Plotnikova TM. Medicines based on divertin. Tomsk, RF: Izd-vo Tomskogo un-ta; 2005. 228 s. (In Russ.)
2. Selivanova IA, Tiukavkina NA, Kolesnik

IuA, Nesterov VN, Kuleshova LN, Khutori-anskii VA i dr. Study of the crystal structure of dihydroquercetin. *Khimiko-farmatsevt. zhurn.* 1999;33(4):51–3. (In Russ.)

3. Selivanova IA, Tiukavkina NA, Terekhov RP, Fenin AA. Stereoisomerism of dihydroquercetin in molecular design format. V: *Sb materialov IV Vseros nauch-prakt konf s mezhdunar uchastiem «Innovatsii v zdorov'e natsii»*. Sankt-Peterburg, RF: S-Peterb gos khimiko-farmatsevt akad; 2016. s. 567–71. (In Russ.)

4. Terekhov RP, Selivanova IA. Computer modeling as a way to develop phytopreparations based on flavonoids. *Farmatsiia. Spets vyp.* 2016;112–6. (In Russ.)

5. Tawfeek N, Sobeh M, Hamdan DI, Far-rag N, Roxo M, El-Shazly AM et al. Phenolic compounds from *Populus alba* L. and *Salix subserrata* Willd. (Salicaceae) counteract oxidative stress in *Caenorhabditis elegans*. *Molecules.* 2019;24(10):1999. doi: 10.3390/molecules24101999

6. Leitão SG, Leitão GG, Vicco DKT, Pereira JPB, de Moraes Simão G, Oliveira DR et al. Counter-current chromatography with off-line detection by ultra high performance liquid chromatography/high resolution mass spectrometry in the study of the phenolic profile of *Lippia origanoides*. *J Chromatography A.* 2017;1520:83–90. doi: 10.1016/j.chroma.2017.09.004

7. Sanz M, de Simón BF, Cadahía E, Esteruelas E, Muñoz AM, Hernández MT et al.

Polyphenolic profile as a useful tool to identify the wood used in wine aging. *Anal Chim Acta.* 2012;732:33–45. doi: 10.1016/j.aca.2011.12.012

8. Milbury PE, Chen CY, Dolnikowski GG, Blumberg JB. Determination of flavonoids and phenolics and their distribution in almonds. *J Agric Food Chem.* 2006;54(14):5027–33. doi: 10.1021/jf0603937

9. Abad García B, Garmon-Lobato S, Berrueta LA, Gallo B, Vicente F. A fragmentation study of dihydroquercetin using triple quadrupole mass spectrometry and its application for identification of dihydroflavonols in Citrus juices. *Rapid Commun Mass Spectrom.* 2009;23(17):2785–92. doi: 10.1002/rcm.4182

10. Ivanova SZ, Fedorova TE, Ivanova NV, Fedorov SV, Ostroukhova LA, Malkov IuA i dr. Flavonoid compounds of the bark of Siberian larch and Gmelin larch. *Khimii rastit syr'ia.* 2002;(4):5–13. (In Russ.)

Адрес для корреспонденции:

119991, Россия,
г. Москва, Трубецкая ул., д. 8, стр. 2,
ИФ ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России,
кафедра химии,
тел.: 8 916 528 41 52,
e-mail: voronin_k_s@staff.sechenov.ru
(crowk92@yahoo.com),
Воронин К. С.

Поступила 30.11.2021 г.

УДК 615.322:577.16

DOI: <https://doi.org/10.52540/2074-9457.2021.4.9>

Д. В. Левушкин, И. В. Гравель

**МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СБОРЫ КАК ИСТОЧНИК
МАКРОЭЛЕМЕНТОВ**

**ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России,
г. Москва, Россия**

Лекарственное растительное сырье содержит не только биологически активные вещества, но и минеральные элементы. В настоящее время лекарственные растительные препараты как источники макроэлементов практически не изучены. Цель работы – изучить содержание макроэлементов, которые могут способствовать проявлению терапевтических эффектов на примере грудного сбора № 4. Проведен анализ содержания макроэлементов (K, Na, Mg, Ca, P, S, Fe) в грудном сборе № 4 и его компонентах методом атомно-эмиссионной спектроскопии. Определен диапазон концентраций макроэлементов (62,71–21705,63 мг/кг). Их средние значения убывали в ряду: K > Ca > Mg > P > S > Na > Fe. В настое из грудного сбора № 4 макроэлементы переходят от 10 до 80%. Обнаружено, что содержание калия, натрия, магния, кальция, фосфора, серы и железа в грудном сборе № 4 составило 25–1100% от суточной потребности, что позволяет